

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 29-8-67 676086

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION D'ORLÉANS (Tél. 87-45-41)

(CHER, INDRE, LOIRET, LOIR-ET-CHER, NIÈVRE, YONNE, EURE & LOIR)

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 21, rue Eugène-Vignat - ORLÉANS
C. C. P. : ORLÉANS 4.604-25

ABONNEMENT ANNUEL
25 Francs

Supplément n° 3 au Bulletin n° 83

17 AOUT 1967

- 31 -

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES

Les sorties des papillons du deuxième vol se poursuivent et des pénétrations sont toujours à craindre. Les pluies de ces derniers jours ont lessivé la dernière application.

En conséquence, il est conseillé de renouveler la protection par un traitement qui devra être réalisé au plus tard au début de la semaine prochaine.

INFORMATIONS

TAVELURE DU POMMIER ET DU POIRIER

Etant donné les conditions climatiques actuelles, il est conseillé d'effectuer un traitement dans tous les vergers. Dans les situations où des contaminations ont été observées, les arboriculteurs devront envisager plusieurs applications pendant le mois de Septembre en tenant compte de la fréquence et de l'abondance des pluies.

MILDIOU DE LA TOMATE

CULTURES LEGUMIERES

Les conditions climatiques sont favorables à la maladie ; un traitement est à effectuer dès réception avec l'un des produits conseillés contre le Mildiou de la pomme de terre.

CULTURES OLEAGINEUSES

DESINFECTION DES SEMENCES DE COLZA

Différents ennemis peuvent détruire les semis de colza, notamment les champignons responsables de la "fonte des semis" et les altises qui rongent les feuilles dès la levée.

La désinfection des semences avec des produits fongicides et insecticides ou des produits mixtes permet d'éviter ces attaques en protégeant les jeunes plantules pendant la période où elles sont les plus sensibles. Les fongicides les plus utilisés contre la "fonte des semis" sont ceux à base de Thirame ou T.M.T.D., de Manèbe, d'Oxyquinoléate de cuivre, d'Organo-mercurique.

Parmi les insecticides c'est le Lindane qu'il convient d'utiliser. Il faut choisir des poudres ayant une haute teneur en matière active et il est nécessaire d'employer 30 à 40g de Lindane par kilo de semences. Celles-ci sont enrobées auparavant avec un peu d'huile végétale à raison d'une cuillerée à café pour 2 kgs de semences.

Généralement les étiquettes portées par les sacs indiquent si un traitement a été réalisé. Cela permet d'éviter de les traiter deux fois avec un même produit.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
agricoles,

G. RIBAUT.
B. PACQUETEAU.

L'Inspecteur de la Protection
des Végétaux,

G. BENAS.

P185